

Concurso Unifesp nº105

**PROVA TEÓRICO-PRÁTICA
GERIATRIA**

Instruções

- A prova teórico-prática compõe-se de **cinco** questões referentes a um caso clínico;
- Os candidatos terão o tempo total de **vinte** minutos para responder as questões;
- O tempo para leitura do caso é de **2min 30seg** e cada questão terá o tempo de **3min 30seg** para ser respondida;
- Após o término do tempo destinado à questão, a próxima será projetada e não será permitido retornar às anteriores;
- As respostas deverão ser **ANOTADAS NA FICHA DE RESPOSTAS**, que serão recolhidas ao final da prova;
- **A EXISTÊNCIA DE RASURA ANULARÁ A RESPOSTA DA QUESTÃO;**
- Ao final do caso, emitido o sinal, o candidato deve entregar a ficha de respostas.

Boa prova!

LEITURA DO CASO CLÍNICO

Questão 1

Realizado Rx simples de bacia, conforme imagem apresentada.

Quanto à avaliação do risco cirúrgico para essa paciente:



- a) a dupla antiagregação plaquetária é impeditiva para o tratamento cirúrgico precoce
- b) o tratamento cirúrgico precoce correlaciona-se com melhor prognóstico
- c) os declínios cognitivo, funcional e nutricional contraindicam o tratamento cirúrgico
- d) o risco cirúrgico é alto e o tratamento cirúrgico deverá se contraindicado
- e) o tratamento cirúrgico deverá ser de emergência pela idade e condição clínica da paciente

Questão 2

As medicações habituais foram suspensas, a volemia restaurada com SF 0,9% e a paciente recebeu 1 unidade de concentrado de glóbulos vermelhos.



Qual analgésico por via parenteral é melhor indicado?

- a) Cetoprofeno
- b) Dipirona
- c) Cloridrato de tramadol
- d) Sulfato de morfina
- e) Fosfato de codeína

Questão 3

Após 48 horas, hemodinamicamente estabilizada e com exames laboratoriais (inclusive coagulograma) e cardiológicos próximos aos padrões de normalidade, foi considerada a correção cirúrgica (haste intramedular).



Qual conduta intraoperatória encontra-se indicada?

- a) Realização sob anestesia peridural
- b) Infusão de colóide intravenoso
- c) Transfusão de plaquetas
- d) Monitorização de pressão venosa central
- e) Desativação do marcapasso

Questão 4

No período pós-operatório, observa-se que a paciente se mantém sonolenta durante o dia e com picos de agitação psicomotora durante a noite.



Escolha a melhor opção:

- a) A administração perioperatória profilática de medicações antipsicóticas teria evitado tal intercorrência
- b) Trata-se de delirium hiperativo e deve ser tratado com dexmedetomidina intravenosa
- c) O uso cauteloso de haloperidol no período noturno poderá ser benéfico
- d) O uso de benzodiazepínicos de curta ação é a melhor opção para o controle do quadro
- e) Mantê-la sob restrição no leito poderá permitir-lhe melhor segurança e conforto

Questão 5

No 8º pós-operatório , apresenta-se taquipneica, com tosse produtiva e com temperatura axilar de 37°C. Rx de Tórax (no leito) normal.



Qual a melhor opção de medicamento para essa paciente?

- a) Dipirona
- b) Furosemida
- c) Ciprofloxacino
- d) Meropenem
- e) Vancomicina

F I M