

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 105
PROVA TÉORICO/PRÁTICA
MÉDICO/ PEDIATRIA GERAL E COMUNITÁRIA
CAMPUS SÃO PAULO/ REITORIA/ HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

CASO CLÍNICO

Menino, 2(dois) anos e 4(quarto) meses de idade, procedente da Bahia, comparece em consulta de rotina na Unidade Básica de Saúde pela primeira vez. A mãe refere que a criança está bem, nasceu de parto normal, a termo, pesando 3220g, sem intercorrências e apresentou dermatite atópica durante o 1º ano de vida. Realizou triagem neonatal que foi normal. De acordo com essa situação responda às seguintes questões.

QUESTÃO 1

Na anamnese e avaliação do desenvolvimento, segundo os marcos da Caderneta de Saúde da Criança, você observou as seguintes habilidades para a faixa etária da criança:

Fala frases com duas palavras, pula com ambos os pés. A criança ainda não veste uma peça de roupa e você não avaliou se ela consegue construir torre de 6(seis) cubos.

Diante dessa situação, como você preencheria a caderneta?

- (a) Veste-se com supervisão – A; Constrói torre de 6(seis) cubos – NV, Fala frases com 2(duas) palavras –P, Pula com ambos os pés – P
- (b) Veste-se com supervisão – F; Constrói torre de 6(seis) cubos – NA, Fala frases com 2(duas) palavras – P, Pula com ambos os pés – P
- (c) Veste-se com supervisão – F; Constrói torre de 6(seis) cubos – NO, Fala frases com 2(duas) palavras – P, Pula com ambos os pés – P
- (d) Veste-se com supervisão – N; Constrói torre de 6(seis) cubos – NV, Fala frases com 2(duas) palavras – S, Pula com ambos os pés – S
- (e) Veste-se com supervisão – N; Constrói torre de 6(seis) cubos – NO, Fala frases com 2(duas) palavras – S, Pula com ambos os pés – S

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 105


QUESTÃO 2

Em relação à alimentação, a mãe refere que ele come bem. Mama no peito várias vezes durante o dia e noite; toma duas mamadeiras de leite de vaca com açúcar (240 mL); nas refeições principais recebe a comida da família amassada; nos intervalos bolacha, gelatina e suco de frutas natural (150 mL). Nunca ofereceu ovo e nem peixe. Qual a melhor orientação para alimentação dessa criança:

- Interromper o aleitamento materno, aumentar o leite de vaca para três vezes ao dia (sem adição de açúcar) e manter alimentação amassada da família
- Manter a amamentação sob livre demanda, suspender o leite de vaca e manter alimentação da família
- Manter a amamentação, organizar os horários das refeições principais e lanches, introduzir peixe e ovo
- Manter a amamentação durante a noite, mudar o leite de vaca para composto lácteo fortificado e suspender o suco de frutas
- Manter a amamentação com horários fixos, introduzir ovo e peixe após 3 anos, retirar bolachas e gelatina dos intervalos

QUESTÃO 3

Ao exame físico, você observou a classificação do índice de massa corporal (IMC) da criança de acordo com o ponto assinalado na curva descrita a seguir. Assinale o diagnóstico antropométrico e a afirmativa mais adequada para esse caso.



- Sobrepeso: cuidado nessa faixa etária com *adiposity rebound* precoce
- Risco de sobrepeso: esse diagnóstico se relaciona aos menores de 5 anos de idade
- Peso elevado para idade: cuidado nessa faixa etária caso não ocorra *adiposity rebound*
- Obesidade: cuidado nessa faixa etária com dislipidemia familiar
- Obesidade grave: cuidado nessa faixa etária, relacionado intolerância à glicose

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 105

QUESTÃO 4

Ao complementar a anamnese, a mãe refere que a criança apresenta crises mensais de chiado e falta de ar há um ano, quando entra em contato com pó e nas mudanças do tempo; é medicado com fenoterol e prednisolona quando procura o pronto-socorro nas crises. Nos intervalos entre as crises, o menino tem tosse noturna, chiado ao correr ou rir muito e necessidade de broncodilatador 2 a 3 vezes por semana. Com base nas informações acima descritas, qual a conduta de escolha para esse quadro?

- (a) Prescrever dose baixa de corticóide inalatório diariamente
- (b) Encaminhar para especialista e realização de prova de função pulmonar
- (c) Prescrever corticóide inalatório em dose moderada/LABA diariamente
- (d) Prescrever salbutamol inalatório contínuo e prednisolona quando necessário
- (e) Verificar pico de fluxo expiratório para ajuste da melhor dose de corticóide inalatório

QUESTÃO 5

O irmão do seu paciente tem 4(quatro) anos de idade e recebeu diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista (TEA) quando ainda moravam na Bahia. Considerando o risco de transtorno psiquiátrico que seu paciente apresenta, qual das alternativas abaixo representa, respectivamente, uma escala de avaliação para risco psíquico que poderia ser realizado desde o primeiro ano de vida e um teste que poderia ser aplicado neste momento para o seu paciente?

- (a) M-CHAT e Irdi
- (b) Irdi e M-CHAT
- (c) Denver e Irdi
- (d) Denver e M-CHAT
- (e) Bayley e Denver